Correction TP : Contrôle de transformations mettant en jeu les réactions d'estérification et d'hydrolyse des esters

I) Réaction d'estérification :

II)

1) Equation de la réaction d'estérification étudiée :

Quantités de matière d'acide acétique et d'éthanol dans l'état initial :

$$n^i(\text{acide acétique}) = \frac{m^i(\text{acide acétique})}{M_{\text{acide acétique}}}$$

$$n^i(\text{acide acétique}) = \frac{\rho^i(\text{acide acétique}) \cdot V(\text{acide acétique})}{M_{\text{acide acétique}}}$$

$$n^i(\text{acide acétique}) = \frac{1,05 \cdot 1,4}{60,0} = 2,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n^i(\text{éthanol}) = \frac{m^i(\text{éthanol})}{M_{\text{éthanol}}}$$

$$n^i(\text{éthanol}) = \frac{\rho^i(\text{éthanol}) \cdot V(\text{éthanol})}{M_{\text{éthanol}}}$$

$$n^i(\text{éthanol}) = \frac{0,79 \cdot 1,4}{46,0} = 2,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

On est donc en présence d'un mélange stoechiométrique puis que l'équation-bilan montre qu'une mole d'acide éthanoïque réagit avec une mole d'éthanol.

2) a) La réaction support du dosage est une réaction acido-basique.

La phénolphtaléine est un indicateur coloré de fin de réaction permettant de repérer l'équivalence.

Les acides susceptibles de réagir avec la soude sont : l'acide éthanoïque (réactif de la réaction) et l'acide sulfurique (catalyseur de la réaction).

b) $V_E = 3,0 \text{ mL}$

c) $V' = V_E - V'_E$

Tube à essai n°	Conditions expérimentales	V_E (mL)	V' (mL)	$n^{\dagger}(\text{ester})$ (mol)
1	Catalyseur, T = 60°C	11,8	8,8	$6,4 \cdot 10^{-3}$
2	Catalyseur, T ambiante	13,3	10,3	$3,4 \cdot 10^{-3}$
3	Pas de catalyseur, T = 60°C	11,2	11,2	$1,6 \cdot 10^{-3}$
4	Pas de catalyseur, T ambiante	11,7	11,7	$6,0 \cdot 10^{-4}$

Equation chimique	Avancement (mol)	$\text{CH}_3\text{-COOH}$	+	$\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH}$	=	$\text{CH}_3\text{-COO}(\text{C}_2\text{H}_5)$	+	H_2O
Quantités de matière	(mol)	$n^i(\text{acide acétique})$	(mol)	$n^i(\text{éthanol})$	(mol)	$n(\text{ester})$	(mol)	$n(\text{eau})$
Etat initial	$x_0 = 0$	$n^i(\text{acide acétique})$		$n^i(\text{éthanol})$		0		0
En cours de transformation	x	$n^i(\text{acide acétique}) - x$		$n^i(\text{éthanol}) - x$		x		x

D'après le tableau, on a :

$$n^{\dagger}(\text{acide acétique}) = n^i(\text{acide acétique}) - x$$

$$\text{et } n^{\dagger}(\text{ester}) = x$$

On en déduit : $n^{\dagger}(\text{ester}) = n^i(\text{acide acétique}) - n^{\dagger}(\text{acide acétique})$

Equation chimique	Avancement	$\text{CH}_3\text{-COOH}_{(aq)}$	+	$\text{OH}^-_{(aq)}$	=	$\text{CH}_3\text{-COO}^-_{(aq)}$	+	$\text{H}_2\text{O}_{(l)}$
Quantités de matière	(mol)	$n(\text{acide acétique})(\text{mol})$		$n(\text{soude})(\text{mol})$		$n(\text{éthanoate})(\text{mol})$		$n(\text{eau})(\text{mol})$
Etat initial	$x'_0 = 0$	$n^i(\text{acide acétique})$		$n^{\text{éq}}(\text{OH}^-)$		0		excès
Etat final (équivalence)	x'_E	$n^i(\text{acide acétique}) - x'_E$		$n^{\text{éq}}(\text{OH}^-) - x'_E$		x'_E		excès

A l'équivalence, les réactifs ont totalement réagi donc on a :

$$n^f(\text{acide acétique}) = 0 \text{ soit } n^i(\text{acide acétique}) - x'_E = 0 \quad n^i(\text{acide acétique}) = x'_E$$

$$n^f(\text{OH}^-) = 0 \quad \text{soit } n^{\text{éq}}(\text{OH}^-) - x'_E = 0 \quad n^{\text{éq}}(\text{OH}^-) = x'_E$$

$$\text{Or } n^{\text{éq}}(\text{OH}^-) = C \cdot V'$$

$$\text{On en déduit : } n^f(\text{ester}) = n^i(\text{acide acétique}) - C \cdot V'$$

Les facteurs cinétiques mis en évidence dans ces expériences sont la température et la présence de catalyseur (acide sulfurique). La vitesse de réaction augmente quand la température augmente et en présence de catalyseur. Le chimiste peut donc jouer sur ces paramètres pour contrôler la vitesse de formation d'un ester.

III)

1) Etude de l'estérification et de l'hydrolyse d'un ester :

2.

Equation chimique	Avancement	$\text{CH}_3\text{-COOH}$	+	$\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH}$	=	$\text{CH}_3\text{-COO}(\text{C}_2\text{H}_5)$	+	H_2O
Quantités de matière	(mol)	$n(\text{acide acétique})(\text{mol})$		$n(\text{éthanol})(\text{mol})$		$n(\text{ester})(\text{mol})$		$n(\text{eau})(\text{mol})$
Etat initial	$x_0 = 0$	$n^i(\text{acide acétique}) = 1$		$n^i(\text{éthanol}) = 1$		0		0
En cours de transformation	x	$1-x$		$1-x$		x		x
Etat final	x_f	$1-x_f$		$1-x_f$		x_f		x_f

3. On a $n^f(\text{ester}) = x_f = 0,67$ mol dans chacun des 3 cas (d'après le doc.1).

Si la réaction était totale, on aurait : $n^f(\text{acide acétique}) = n^i(\text{acide acétique}) - x_{\text{max}} = 0$ soit $x_{\text{max}} = n^i(\text{acide acétique}) = 1$ mol

$$\text{Le taux d'avancement final de la réaction est donc : } \tau = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} = \frac{0,67}{1} = 0,67$$

4.

$\tau < 1$: la réaction d'estérification est donc une transformation limitée (quelque soit la température et en présence ou non de catalyseur).

5. Composition du système lorsque l'équilibre est atteint dans les 3 cas :

$$n^f(\text{acide acétique}) = 0,33 \text{ mol} \quad n^f(\text{éthanol}) = 0,33 \text{ mol} \quad n^f(\text{ester}) = 0,67 \text{ mol} \quad n^f(\text{eau}) = 0,67 \text{ mol}$$

La réaction chimique inverse de l'estérification porte le nom d'**hydrolyse**.

Sur le document 2 ci-dessus, on étudie l'évolution d'un système constitué initialement d'une mole d'acétate d'éthyle et d'une mole d'eau. Les courbes donnent l'évolution temporelle de la quantité de matière d'acide acétique formé dans les mêmes conditions expérimentales que celles du document 1.

7.

Equation chimique	Avancement	$\text{CH}_3\text{-COO}(\text{C}_2\text{H}_5)$	+	H_2O	=	$\text{CH}_3\text{-COOH}$	+	$\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH}$
Quantités de matière	(mol)	$n(\text{ester})(\text{mol})$		$n(\text{eau})(\text{mol})$		$n(\text{acide acétique})(\text{mol})$		$n(\text{éthanol})(\text{mol})$
Etat initial	$x'_0 = 0$	$n^i(\text{ester}) = 1$		$n^i(\text{eau}) = 1$		0		0
En cours de transformation	x'	$1-x'$		$1-x'$		x'		x'
Etat final	x'_f	$1-x'_f$		$1-x'_f$		x'_f		x'_f

8. Dans chacun des 3 cas, on a $n^f(\text{acide acétique}) = x'_f = 0,33$ mol (d'après le doc.2).

Si la réaction était totale, on aurait : $n^f(\text{ester}) = n^i(\text{ester}) - x'_{\text{max}} = 0$ soit $x'_{\text{max}} = n^i(\text{ester}) = 1$ mol

$$\text{Le taux d'avancement final de la réaction est donc : } \tau = \frac{x'_f}{x'_{\text{max}}} = \frac{0,33}{1} = 0,33$$

9.

$\tau < 1$: la réaction d'hydrolyse est donc une transformation limitée (quelque soit la température et en présence ou non de catalyseur).

10. Composition du système lorsque l'équilibre est atteint dans les 3 cas :

$$n^f(\text{acide acétique}) = 0,33 \text{ mol} \quad n^f(\text{éthanol}) = 0,33 \text{ mol} \quad n^f(\text{ester}) = 0,67 \text{ mol} \quad n^f(\text{eau}) = 0,67 \text{ mol}$$

11. Le taux d'avancement final des réactions d'estérification et d'hydrolyse ne dépend pas de la température ou de la présence de l'acide sulfurique.

12. La composition du système à l'équilibre pour les réactions d'estérification et d'hydrolyse est la même : il s'agit donc bien de réactions inverses l'une de l'autre.

13. Constante d'équilibre de la réaction d'estérification :

$$K = \frac{[R-COO-R']_{\text{éq}} \cdot [H_2O]_{\text{éq}}}{[R-COOH]_{\text{éq}} \cdot [R'-OH]_{\text{éq}}} = \frac{n^f(\text{ester}) \cdot n^f(\text{eau})}{n^f(\text{acide}) \cdot n^f(\text{alcool})} = \frac{0,67 \cdot 0,67}{0,33 \cdot 0,33} = 4$$

14. Constante d'équilibre de la réaction d'hydrolyse :

$$K' = \frac{[R-COOH]_{\text{éq}} \cdot [R'-OH]_{\text{éq}}}{[R-COO-R']_{\text{éq}} \cdot [H_2O]_{\text{éq}}} = \frac{n^f(\text{acide}) \cdot n^f(\text{alcool})}{n^f(\text{ester}) \cdot n^f(\text{eau})} = \frac{0,33 \cdot 0,33}{0,67 \cdot 0,67} = 0,25$$

$$K' = \frac{1}{K}$$

2) Influence d'un excès d'un des réactifs :

Le tableau ci-dessous présente des résultats concernant des systèmes chimiques constitués à l'état initial d'acide acétique et d'éthanol. Dans chaque cas, l'un des deux réactifs est en excès par rapport à l'autre ; $n^i(\text{acide})$ et $n^i(\text{alcool})$ sont respectivement les quantités de matière d'acide carboxylique et d'alcool à l'état initial et $n^f(\text{ester})$ la quantité de matière d'ester à l'équilibre. Les conditions expérimentales sont un chauffage à reflux et la présence d'acide sulfurique dans le milieu.

2.

Equation chimique	Avancement (mol)	$\text{CH}_3\text{-COOH} +$ $n(\text{acide acétique})(\text{mol})$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH} =$ $n(\text{éthanol})(\text{mol})$	$\text{CH}_3\text{-COO}(\text{C}_2\text{H}_5) +$ $n(\text{ester})(\text{mol})$	H_2O $n(\text{eau})(\text{mol})$
Quantités de matière		$n^i(\text{acide acétique})$	$n^i(\text{éthanol}) = 1$	0	0
Etat initial	$x_0 = 0$	$n^i(\text{acide acétique})$	$n^i(\text{éthanol}) = 1$	0	0
En cours de transformation	x	$n^i(\text{acide acétique}) - x$	$n^i(\text{éthanol}) - x$	x	x
Etat final	xf	$n^i(\text{acide acétique}) - x_f$	$n^i(\text{éthanol}) - x_f$	xf	xf

3.

Système chimique	$n^i(\text{acide})(\text{mol})$	$n^i(\text{alcool})(\text{mol})$	$n^f(\text{ester})(\text{mol})$	$x^f(\text{mol})$	$x_{\text{max}}(\text{mol})$	τ
1	1	5	0,95	0,95	1	0,95
2	1	2	0,85	0,85	1	0,85
3	2	1	0,85	0,85	1	0,85
4	5	1	0,95	0,95	1	0,95

4. Lorsqu'un des réactifs est en excès, le taux d'avancement final est plus grand (ici $\tau > 0,67$).

5. Dans l'industrie, on choisit le réactif introduit en excès le moins coûteux.

3) Influence de l'élimination d'un des produits :

1. τ est plus élevé : l'élimination d'un produit a donc la même influence que l'introduction d'un réactif en excès.
2. Le méthanoate d'éthyle est distillé au cours de sa formation car c'est lui qui a la température d'ébullition la plus faible.
3. Le milieu réactionnel est maintenu à 54,3 °C (température d'ébullition du composé le plus volatile).
4. Au cours du temps, les quantités d'acide et d'alcool diminuent (réactifs), la quantité d'eau augmente (produit) et la quantité d'ester reste nulle puisqu'il est distillé au fur et à mesure de sa formation.
5. 3 conditions sont nécessaires pour pouvoir utiliser ce procédé :
 - Les températures d'ébullition des produits ne doivent pas être trop élevées,
 - La température d'ébullition d'un des produits doit être plus faible que celles des réactifs,
 - Les températures d'ébullition des réactifs et des produits sont suffisamment différentes les unes des autres.

$$- Q_r = \frac{[\text{H-COO-C}_2\text{H}_5][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{H-COOH}][\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH}]} = \frac{n(\text{H-COO-C}_2\text{H}_5).n(\text{H}_2\text{O})}{n(\text{H-COOH}).n(\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH})}$$

$$- Q_{ri} = \frac{n_i(\text{H-COO-C}_2\text{H}_5).n_i(\text{H}_2\text{O})}{n_i(\text{H-COOH}).n_i(\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH})} = 0 \text{ car } n_i(\text{H-COO-C}_2\text{H}_5) = 0 \text{ et } n_i(\text{H}_2\text{O}) = 0$$

- $Q_{ri} < K$: on a donc évolution de la réaction dans le sens direct.

- *En éliminant l'ester au fur et à mesure de sa formation, on agit sur $n(\text{ester})$ dans l'expression de Q_r .*

- *Q_r reste ainsi petit et donc inférieur à K . On empêche ainsi le système d'atteindre l'état d'équilibre, il continuera donc à évoluer dans le sens direct. Le taux d'avancement final sera donc plus grand.*

IV) Conclusion :

- Pour augmenter la vitesse de formation d'un ester, on peut donc :
 - Augmenter la température du milieu réactionnel,
 - Réaliser la transformation chimique en présence d'un catalyseur : l'acide sulfurique.
- Pour augmenter le taux d'avancement final de la réaction d'estérification (et donc le rendement de la transformation chimique), on peut :
 - Introduire un réactif en excès,
 - Éliminer l'un des produits au fur et à mesure de sa formation.
- Contrôler ainsi les réactions chimiques permet de produire plus rapidement et à moindre coût (plus τ est grand et moins il faut de réactif pour produire la même quantité de produit).